



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ.13 ημερομηνίας 31/12/2012 για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και την επιστολή του αιτητή με ημ. 22/11/2012 για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **..ACYLON GOLD COMBI 45WG..** ως ακολούθως:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

2583

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

03/01/2013

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/09/2017

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas AEBE  
Λ. Ανθούσας  
15349 – Ανθούσα, Αττική  
Ελλάδα

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

E. H. Alevras & Sons Agriculture House Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

E. H. Alevras & Sons Agriculture House Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Acylon Gold Combi 45WG

2. Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: metalaxyl-M: 5% β/β  
folpet: 42% β/β  
βοηθητικές ουσίες: 52,1% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: 1. IPT – Pergande GmdH, Γερμανία  
2. Syngenta Agro S.A.S Γαλλία  
3. Kwizda Agro GmbH, Αυστρία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. Syngenta Hellas AEBE  
2. Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία  
3. Χελλαφαρμ ΑΕ Άγιος Ιωάννης Στυλίδα

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα εντός χαρτοκυτίου	200γρ., 400γρ., 800γρ., 1Kg, 2Kg και 5Kg	Σακούλα με τριπλό τοίχωμα PET (polyester) ALU (aluminium) LLDPE (Linera density polyethylene) εντός χαρτοκυτίου.
2.	Σακούλα	200γρ., 400γρ., 800γρ., 1Kg, 2Kg και 5Kg	Σακούλα με τριπλό τοίχωμα PET (polyester) ALU (aluminium) LLDPE (Linera density polyethylene)

### Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

1. metalaxyl-M  
2. folpet

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

1. 910gr/Kg  
2. 940gr/Kg

3. Παρασκευαστής των δ.ο.:

1. **metalaxyl-M**: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία  
2. **folpet**: Makhteshim-Agan Agrochemicals Division Ltd., Ισραήλ

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

**metalaxyl-M**: CABB AG, Ελβετία  
**folpet**:  
Makhteshim-Agan Agrochemicals Division L.t.d., Ισραήλ

### Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε αμπέλι.  
Το metalaxyl-M είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση κατά των ωμοκλήτων που κινείται μέσα στο φυτό με αποπλαστική κυρίως κίνηση παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του παθογόνου μέσα στους φυτικούς ιστούς.  
Το folpet είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.  
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

## 5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. μέγιστη		
<b>Αμπέλι</b> (οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200	50 – 100	200	Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν κατά την κρίσιμη, για την ανάπτυξη του περονόσπορου, περίοδο της άνθησης και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10-14 ημέρες. *	Μέχρι 4 εφαρμογές κάθε 10 -14 ημέρες εφ' όσον αυτό απαιτείται

### Παρατηρήσεις:

\*Το μικρότερο μεσοδιάστημα (10 ημέρες) να εφαρμόζεται σε περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής

1. Εφαρμόστε τη συνιστώμενη δόση με την κατάλληλη ποσότητα ψεκαστικού υγρού, ώστε να καλυφθεί πλήρως το φύλλωμα του φυτού.
2. Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά πριν εκδηλωθεί η ασθένεια κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης των φυτών.
3. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων (στις περιοχές που εφαρμόζονται).
4. Περίπου 7-10 ημέρες μετά τον τελευταίο ψεκασμό με Acylon Gold Combi 45 WG, συνεχίστε τους ψεκασμούς με μυκητοκτόνα επαφής ή διασυστηματικά με διαφορετικό τρόπο δράσης.
5. Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση των ακάρεων.
6. Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή ίση 1%.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες)	42 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: - metalaxyl-M: 4  
- folpet: M4**

1. Συνιστάται μόνο σε προληπτικούς και όχι θεραπευτικούς ψεκασμούς και κατά προτίμηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου
2. Ανάλογα με την καλλιέργεια ο αριθμός των εφαρμογών να περιορίζεται σε 3-4 ψεκασμούς ανά καλλιεργητική περίοδο (μέχρι 2 συνεχόμενες)
3. Τα διαστήματα μεταξύ των εφαρμογών να μην υπερβαίνουν τις 14 ημέρες και μπορούν να είναι μικρότερα σε περίπτωση υψηλής πίεσεως προσβολής.
4. Μετά τη 2<sup>η</sup> εφαρμογή με το Acylon Gold Combi 45 WG η επόμενη πρέπει να γίνεται με μυκητοκτόνο διαφορετικού τρόπου δράσεως από τα φαινυλαμίδια και στη συνέχεια να τηρείται το συνιστώμενο μεσοδιάστημα του άλλου μυκητοκτόνου.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

----

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

----

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής .  
Να μην εφαρμόζεται σε φυτώρια αμπέλου

10. Συνδυαστικότητα:

---

11. Σήμανση φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Xn – Επιβλαβές, N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

12. Φράσεις κινδύνου:

<b>R20</b>	Επιβλαβές όταν εισπνέεται
<b>R40</b>	Ύποπτο καρκινογένεσης
<b>R43</b>	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
<b>R50/53</b>	Πολύ τοξικό για τούς υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

13. Φράσεις ασφάλειας:

<b>S1/2</b>	Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
<b>S13</b>	Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
<b>S20/21</b>	Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
<b>S36/37</b>	Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια «Να φοράτε προστατευτική μάσκα» «Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου των εργατών στον αγρό σύντομα μετά την εφαρμογή»
<b>S60/61</b>	Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
<b>SP1</b>	Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
<b>SPe3</b>	Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας <b>5 μέτρων</b> από τα επιφανειακά ύδατα για το αμπέλι

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης”

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατεύστε τον από υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασεως καλέστε αμέσως γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.  
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε ιατρικό ενεργό άνθρακα, διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην προκαλέσετε εμετό, σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

**Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο

**ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: .....03/01/2013.....

.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα