

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Nuprid 200SL με αριθμό εγγραφής 2792...

5 Οκτωβρίου 2009

Κάτοχος εγγραφής: Nufarm SAS, Γαλλία

Εμπορικό Όνομα: Nuprid 200SL

Μορφή: Υδατοδιαλυτό υγρό (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: imidacloprid 20% β/ο

βοηθητικές ουσίες 81,86% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: imidacloprid 98% min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Nufarm Ltd, Αυστραλία

Παρασκευαστής σκευάσματος: Nufarm Ltd, Αυστραλία

Διανομέας: L. Lambrou Agro Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος ή ριζοποτίσματα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Εχθρός	Δόση (κ.εκ / 100 λ νερό)	Μέγιστος αρ. εφαρμογών	Χρόνος ασφάλειας
Εσπεριδοειδή	Εριώδης αλευρώδης	75	2	30
	Φυλλοκνίστης	50-75		
Καρυδιά	Αφίδες	50	2	14
		ριζοπότισμα: 10-40 κ.εκ/ δένδρο		
Μηλιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	14
Αχλαδιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	14
	Ψύλλα της αχλαδιάς	60		
Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκκιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	14
Δαμασκηνιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	21
Κερασιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	28
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Αγγούρι Κολοκύθι Καρπούζι Πεπόνι	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	3
		ριζοπότισμα: 100 κ.εκ / 1200-1500 φυτά		
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Αγγούρι Κολοκύθι Καρπούζι Πεπόνι	Αλευρώδεις	50	2	3
		ριζοπότισμα: 100 κ.εκ / 1200-1500 φυτά		
Κραμβοειδή	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	28
		ριζοπότισμα: 100 κ.εκ / 1200-1500 φυτά		

Πατάτες	Αφίδες	25-30	1	30
Καπνός	Αφίδες	25-30	2	14
Καλλωπιστικά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	-

Παρατηρήσεις:

- Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.

- Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα "ολοκληρωμένης αντιμετώπισης" συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωοτοκία.

- Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρουσία μελιτωμάτων) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.

- Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 4A

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Σήμανση τοξικότητας: Xi – Ερεθιστικό

Φράσεις κινδύνου:

R36 Ερεθίζει τα μάτια

R52 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς

R57 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες

Βλαβερό για τα πουλιά

Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.

Φράσεις ασφάλειας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
- S25** Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
- S35** Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο
- S36/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου
- S61** Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και μακριά από τη μολυσμένη περιοχή.

Ζητείστε ιατρική συμβουλή

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή

Αν καταποθεί μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και στη συνέχεια πιείτε άφθονο νερό. Χορηγήστε ενεργό άνθρακα. Συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.