

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος ΘΕΙΑΦΙ με αριθμό εγγραφής 2840.

08 Μαρτίου 2011

Κάτοχος εγγραφής:..... Zolfindustria Srl, Italy.....

Εμπορικό Όνομα:..... Θειάφι.....

Μορφή:..... Σκόνη επίπασης (DP).....

Εγγυημένη σύνθεση:..... Sulphur 99% β/β.....

..... βοηθητικές ουσίες 1% β/β.....

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:..... Sulphur 99,5% w/w min.....

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:..... Zolfindustria Srl, Ιταλία.....

Παρασκευαστής σκευάσματος:..... Zolfindustria Srl, Ιταλία.....

Εργοστάσιο συσκευασίας:..... Zolfindustria Srl, Ιταλία.....

Διανομέας:..... Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.....

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

..... Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.....

Τρόπος εφαρμογής:

..... Με επίπαση ως έχει.....

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:-----

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Εχθρός	Δόση (Kg./εκτάριο)	Στάδιο εφαρμογής
Μηλιά Αχλαδιά	στάκτη	25-30 Kg ανά εκτάριο	Στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής. Στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Ροδακινιά Νεκταρινιά	στάκτη		Στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής, στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Αμπέλι	στάκτη		- Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκατ. - Κατά την άνθηση, μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 ημέρες μέχρι το στάδιο του «γυαλίσματος» των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής. - Έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών.
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	στάκτη		Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.
Κολοκυνθοειδή: αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι	στάκτη		Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.
Φράουλα	στάκτη		
Τριανταφυλλιά	στάκτη		Μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκατ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών: 4 σε όλες τις καλλιέργειες

Παρατηρήσεις :

- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων.
- Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18 °C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 °C.

Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 5 ημέρες

Φυτοτοξικότητα: Όταν χρησιμοποιείται μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού προκαλεί φυτοτοξικότητα.

Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28 °C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά.

Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap), αχλαδιάς (Buona Luigia D' Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio).

Συνδιαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με ορυκτέλαια, με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης καθώς και με σκευάσματα που περιέχουν captan.

Σήμανση τοξικότητας: Xi – Ερεθιστικό

Φράσεις κινδύνου:

R 38 Ερεθίζει το δέρμα

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 20 λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το κουτί ή την ετικέτα. Πιείτε 2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό με ερεθισμό του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό εάν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ανάκληση της έγκρισης

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.