



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3283, ημερομηνίας 06/03/2009 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και

την επιστολή του αιτητή με ημ. 16/06/2010 για χορήγηση προσωρινής άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της προσωρινής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν

.....**AFFIRM**..... με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2906

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

23/11/2011

Ημερομηνία λήξης άδειας:

28/01/2016

2. Κάτοχος της άδειας:

SYNGENTA HELLAS AEBE

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Co Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Co Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί	250γρ., 300γρ., 500γρ., 600γρ., 1κιλ.	Fluorinated high density polyethylene or Co-extruded high density polyethylene / polyamide (PE/PA)
2	Δοχείο	250γρ., 300γρ., 500γρ., 600γρ., 1κιλ., 5 κιλ.	

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των λεπιδοπτέρων της αμπέλου, των καρποφόρων και των οπωροκηπευτικών. Το Affirm ανήκει στην οικογένεια των αβερμεκτινών. Δρα παρεμποδίζοντας τη μεταβίβαση των νευρικών σημάτων του εντόμου μέσω του καναλιού του χλωρίου. Το έντομο παύει να τρέφεται και υφίσταται μία μη ανατρέψιμη παράλυση. Το Affirm δρα ειδικώς στις προνύμφες των λεπιδοπτέρων εξ επαφής και διά στομάχου.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος – Μην εφαρμόζετε κατά τις ζεστές ώρες της ημέρας, σε βρεγμένα φύλλα ή σε περίπτωση βροχής

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με νερό κατά το 1/4. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Αναδεύετε και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ. σκ./δεκ.		
Αμπέλι Επιτραπέζιο & οينوποιήσιμο	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) Κοχυλίδα (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	150	150	Πριν την άνθηση με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών για την πρώτη γενιά Για τη δεύτερη και τρίτη γενιά εφαρμόστε στο στάδιο του «μαύρου κεφαλιού». Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής πραγματοποιείτε την 1ην εφαρμογή κατά το στάδιο εναπόθεσης των αυγών και τη 2ην μετά από 7-14 ημέρες	3
Μηλοειδή Μηλιά Αχλαδιά	Καρπόκαπα <i>Cydia Pomonella</i> <i>Cydia molesta</i>	300	300-400	Με την εκκόλαψη των πρώτων αυγών ή στο αποκορύφωμα των πτήσεων χρησιμοποιώντας παγίδες παρακολούθησης	2 Με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών
	Φυλλοδέτες: (<i>Adoxophyes spp.</i> , <i>Pandemis spp.</i> , <i>Archips spp.</i> , <i>Argyrotaenia spp.</i>)			Για τις διαχειμάζουσες προνύμφες: πριν ή μετά την άνθηση Θερινές γενεές: Με την εκκόλαψη των πρώτων αυγών ή στο αποκορύφωμα των πτήσεων χρησιμοποιώντας παγίδες παρακολούθησης	
	Φυλλορύκτες: (<i>Leucoptera spp.</i> , <i>Phyllonorycter spp.</i>)			Με την εμφάνιση των πρώτων στοών στα φύλλα	
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά	Καρπόκαπα (<i>Cydia molesta</i>)	300	300-400	Με την εκκόλαψη των πρώτων αυγών ή στο αποκορύφωμα των πτήσεων χρησιμοποιώντας παγίδες παρακολούθησης	3 Με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών
	Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>)			Για τις διαχειμάζουσες προνύμφες: πριν ή μετά την άνθηση Θερινές γενεές: Με την εκκόλαψη των πρώτων αυγών ή στο αποκορύφωμα των πτήσεων χρησιμοποιώντας παγίδες παρακολούθησης	
	Φυλλορύκτες <i>Phyllonorycter spp.</i>			Με την εμφάνιση των πρώτων στοών στα φύλλα	

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ. σκ./δεκ.		
Υπαίθρου Αγκινάρα Φασόλια Φασολάκι Μπρόκολα Κουνουπίδι Κραμπί	Λεπιδόπτερα <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Plusia gamma</i> , <i>Pieris brassicae</i> , <i>Plutella xylostella</i> , <i>Depressaria erinaceella</i> <i>Tuta absoluta</i>	150	150	Ψεκασμός κάλυψης με την εμφάνιση της προσβολής	3 Με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών
Υπαίθρου & Θερμοκηπίου Τομάτα Πιπεριά Μελιτζάνα Φράουλα		150	150		
Υπαίθρου & Θερμοκηπίου Μαρούλια Λυκοτρίβολο Κάρδαμο Γαιοκάρδαμο Ρόκα Άγρια Ρόκα Σινάπι Φύλλα & Βλαστοί των ειδών <i>Brassica spp</i> Υπαίθρου Σκαρόλα Άγριο κичώριο Κичώριο Αντίδι Ραδίκι	<i>Spodoptera spp.</i> <i>Ostrinia nubilalis</i>	150	150		

Παρατηρήσεις:

1. Ανεξάρτητα του όγκου του ψεκαστικού υγρού που θα χρησιμοποιηθεί, να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση σκευάσματος ανά δεκάριο.
2. Μην αναμιγνύεται το προϊόν με λάδι όταν εφαρμόζετε στη βερικοκκιά

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Βερικοκιά	14
Αμπέλι, μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, νεκταρινιά	7
Υπόλοιπες καλλιέργειες	3

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Ομάδα Τρόπου Δράσης: 6

- Εφαρμογές στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα.
- Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Στις λιγότερο διαδεδομένες ή νέες ποικιλίες λαχανικών να πραγματοποιείται δοκιμαστική εφαρμογή. Να μην χρησιμοποιείται σε αμπέλια στα φυτώρια.

10. Συνδυαστικότητα:

Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλα σκευάσματα, να πραγματοποιείται δοκιμαστική εφαρμογή.

11. Σήμανση φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

12. Φράσεις κινδύνου:

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

13. Φράσεις ασφάλειας:

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
S35 Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο
S57 Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί μόλυνση
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

SPe1 Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του . Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **12 μέτρων** από τα επιφανειακά νερά, για την καλλιέργεια της μηλιάς, αχλαδιάς και των πυρηνοκάρπων

Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.

Να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας

Καταστρέψτε και απομακρύνετε τα αυτοφυή ζιζάνια. Εφαρμόστε κατά τις βραδινές ώρες όταν δεν δραστηριοποιούνται οι μέλισσες.

Κλείστε και καλύψτε τις αποικίες των βομβίνων σε περίπτωση χρήσης του σκευάσματος στο θερμοκήπιο για όλες τις χρήσεις με εξαίρεση το μαρούλι. Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος κρατήστε το θερμοκήπιο κλειστό για 24 ώρες για προστασία των μελισσών.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για μερικά λεπτά διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα, και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα εργασίας και ξεπλυθείτε καλά, με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Τα ρούχα εργασίας πρέπει να πλυθούν πριν ξαναφορηθούν.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και διατηρήστε τον ζεστό σε ανάπαυση. Καλέστε προληπτικά γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS). Μην προκαλέσετε εμετό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 112 ή 199

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: 21/03/2012

.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα