

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος **Confidor 200SL** με αριθμό εγγραφής **1790**

05 Απριλίου 2011

Κάτοχος εγγραφής: Bayer CropScience AG, Germany

Εμπορικό Όνομα: Confidor 200SL

Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγραμμένη σύνθεση: imidacloprid 20% β/ο

βοηθητικές ουσίες 82,37% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: imidacloprid 97% min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Bayer CropScience AG, Germany

Παρασκευαστής σκευάσματος: Bayer CropScience AG, Germany

Διανομέας: Costas Christodoulou Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος ή ριζοποτίσματα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ' ευθείαν στο ψεκαστήριο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόση (κ.εκ. σκευάσ. / 100 λίτρα)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Δόση (κ.εκ. σκευάσ./ δεκ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ	Εριώδης αλευρώδης (<i>Aleurothrixus floccosus</i>) Φυλλοκνίστης (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	75	250-400	150-300	Με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδια L1 και L2). Με την έναρξη της προσβολής	2 Με μεσοδιάστημα 20-30 ημέρες
Αχλαδιά	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Cacopsylla pyri</i>)	60	150	90	Με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Πριν την άνθηση μέχρι το στάδιο έναρξης της λευκής κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79)	1
Ροδακινιά	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i>)	25-30*	150-250	37,5 – 75	Με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Πριν την άνθηση μέχρι το στάδιο έναρξης της ρόδινης κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79)	2 Με μεσοδιάστημα 28 ημέρες
Τομάτα υπαίθρου	Αφίδες (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	50	50-100	25 – 50	Ψεκάσμος φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής	2
Τομάτα θερμοκηπίου	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)			75 – 125 ⁽⁵⁾	Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης	Με μεσοδιάστημα 14 ημέρες

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόση (κ.εκ. σκευάσ. / 100 λίτρα)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Δόση (κ.εκ. σκευάσ./ δεκ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
Αγγούρι (θερμοκηπίου και υπαίθρου)	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)			75 – 125 ⁽⁵⁾	Ριζοπότισμα - προληπτική εφαρμογή	2 Με μεσοδιάστημα 14 ημέρες
Βαμβάκι	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>)		50-80	50	Με την έναρξη της προσβολής	
Πατάτα	Αφίδες (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)		50-100	50	Με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα	
Καπνός	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotiana</i>)	25 – 60	50 – 100	25 – 30	<u>Ψεκασμός φυλλώματος</u> με την εμφάνιση της προσβολής. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται με την επανεμφάνιση της προσβολής	2 Με μεσοδιάστημα 20-30 ημέρες
		-----	-----	50 – 100	<u>Ριζοπότισμα</u> με νερό της μεταφύτευσης	1

*: το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής

Χρόνος Ασφαλείας

Αχλαδιά, Τομάτα, Αγγούρι, Καπνός

7 ημέρες

Ροδακινιά, Πατάτα

14 ημέρες

Εσπεριδοειδή

21 ημέρες

Βαμβάκι

28 ημέρες

Καπνός (ριζοπότισμα)

μια εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση

Παρατηρήσεις:

1. Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωτοκία.
2. Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
3. Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.
4. Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής εριώδη αλευρώδη (μικτός πληθυσμός) συνιστάται η προσθήκη θερινού λαδιού σε δόση 1 λίτρου.
5. Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοπτόσιμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών.
6. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.
7. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης.
8. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο)

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 4A

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής

Συνδιαστικότητα: Συνδυάζεται με τα μυκητοκτόνα ANTRACOL 70WP, ANTRACOL COMBI X, BAYCOR 25 WP, BAYFIDAN 250 EC

Σήμανση τοξικότητας: -

Φράσεις κινδύνου:

R57 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες

Βλαβερό για τα πουλιά

Φράσεις ασφάλειας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
- S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα
- S36/37** Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
- SY8** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο πάθοντας λιποθυμήσει τοποθετήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα.

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον πάθοντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα καλά με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Πλύση στομάχου και χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ανάκληση της έγκρισης

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.