

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Borneo 11SC με αριθμό εγγραφής 2724 .

24 Ιουλίου 2008

Κάτοχος εγγραφής: Spyros Stavrinos Chemicals Ltd

Εμπορικό Όνομα: Borneo 11SC

Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: etoxazole 11% β/ο

βοηθητικές ουσίες 88.84% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: etoxazole 94.8% w/w min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. France

Παρασκευαστής σκευάσματος: Sumitomo Chemical Co Ltd., Japan

Διανομέας: Spyros Stavrinos Chemicals Ltd

### Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Ακαρεοκτόνο επαφής. Παρεμποδίζει την εξέλιξη των αυγών και των άλλων ατελών σταδίων των ακάρεων.

Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση τετρανύχων σε μηλιά, αχλαδιά, βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή, τομάτα, μελιτζάνα και βαμβάκι.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος πλήρους κάλυψης φυλλώματος

### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και κατά τον ψεκάσμό.

**Φάσμα δράσης**

Καλλιέργειες	Εχθρός	Δόση (κ.εκ. / 100 λ νερό)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, γκρέιπφρουτ, φράππα)	Τετράνυχοι ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citrii</i> )	15 ή	200-300	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών
		20 ή	200-250	
		25	200	
Μηλιά, Αχλαδιά	Τετράνυχοι (κίτρινος: <i>Tetranychus urticae</i> , κόκκινος: <i>Panonychus ulmi</i> )	25-30 ή	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά.
		35-50	100	
Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Τετράνυχοι ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> )	25-30 ή	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά.
		35-50	100	
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια )	Τετράνυχοι ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> )	25 ή	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Τέλος Άνοιξης – μέσα Ιουνίου με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών
		30-50	50	
Τομάτα Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι ( <i>Tetranychus urticae</i> )	25-35	50-100 (υπαίθρου)	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών.
		25-30 ή	50-150 (θερμοκηπίου)	
		35	50-100 (θερμοκηπίου)	
Βαμβάκι	Τετράνυχοι ( <i>Tetranychus urticae</i> )	30-37,5 κ.εκ. / δεκάριο	50-80	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Πριν από το άνοιγμα των καρυδιών με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών.

- **Μία** εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας

- Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού

- Διάρκεια προστασίας 45-60 ημέρες

**Χρόνος Ασφάλειας:**

Βαμβάκι:	35 ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι:	28 ημέρες
Εσπεριδοειδή, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά:	14 ημέρες
Τομάτες, Μελιτζάνες:	3 ημέρες

**Φυτοτοξικότητα:** ..... Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και  
..... δόσεις εφαρμογής .....

**Σήμανση τοξικότητας:** N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον .....

**Φράσεις κινδύνου:**

**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει  
..... μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον .....

**Φράσεις ασφάλειας**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά .....

**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές .....

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε .....

**S37** Φοράτε κατάλληλα γάντια .....

**S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα  
..... απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε  
..... ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας .....

**Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας:**  
**5 μέτρα** μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργειες βαμβακιού, τομάτας και μελιτζάνας αγρού  
**10 μέτρα** μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργεια αμπελιού  
**20 μέτρα** μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργειες εσπεριδοειδών, μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

Σε περίπτωση που ο εργάτης εισέρχεται στον αγρό μετά τον ψεκασμό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

## Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με τα ρούχα ή το δέρμα αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Τα ρούχα να μην ξαναφορεθούν αν δεν πλυθούν καλά

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

## Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.

## Ανάκληση της έγκρισης

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.