

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος **Bordo Mix 20WP** με αριθμό εγγραφής **2750** .

**10 Δεκεμβρίου 2008**

Κάτοχος εγγραφής: **Industrias Quimicas Del Valles, S.A., Spain**

Εμπορικό Όνομα: **Bordo Mix 20WP**

Μορφή: **Βρέξιμη Σκόνη (WP)**

Εγγυημένη σύνθεση: **Bordeaux mixture 20% (expressed as Cu<sup>2+</sup>)**

**βοηθητικές ουσίες 23% β/β**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: **copper 255 g/kg min.**

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: **Industrias Quimicas Del Valles, S.A., Spain**

Παρασκευαστής σκευάσματος: **Industrias Quimicas Del Valles, S.A., Spain**

Διανομέας: **Spyros Stavrinides Chemicals Ltd, Cyprus**

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

**Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση**

Τρόπος εφαρμογής: **Ψεκασμοί φυλλώματος**

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

**Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού, προσθέστε το στο ψεκαστήρα και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.**

**Φάσμα δράσης**

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόση (γρ. / 100 λ νερό)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών	Χρόνος εφαρμογής
Εσπεριδοειδή	κορυφοξήρα ( <i>Phoma tracheiphila</i> )	200	4	Προληπτικές εφαρμογές το φθινόπωρο και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας
	<i>Pseudomonas syringae</i> - προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών			Εφαρμογές που αρχίζουν το φθινόπωρο πριν την έναρξη των βροχών και επαναλαμβάνονται μετά από χαλάζι ή παγετό.
Μηλιά Αχλαδιά	φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i>	600-1000	2	Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
<b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</b> Βερικοκιά Κερασιά Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηινιά	Εξώασκος ( <i>Taphrina deformans</i> )  Κορύνεο ( <i>Stigmina carophila</i> )  Φαιά σήψη ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	600-1000	2	Προληπτικές εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάρτια.
Αμπέλι	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )  Ανθράκνωση ( <i>Elsinoe ampelina</i> )	600-1000	5	Ποληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν την άνοιξη όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προσβολή συνθήκες και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών.
Ελιά	Κυκλοκόνιο ( <i>Cycloconium oleaginum</i> ) ( <i>Spilocaea oleagina</i> )	600-1000	4	Δύο εφαρμογές: Η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2εκ.
	Γλοιοσπόριο ( <i>Gloeosporium olivarum</i> )			Δύο εφαρμογές: α. όταν αρχίσουν να ωριμάζουν οι καρποί β. 20 ημέρες αργότερα
	καρκίνωση ( <i>Pseudomonas savastanoi</i> )			Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό

<b>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> Κρεμμύδι, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Σέλινο, Πράσο, Φασόλι, Πεπόνι, Καρπούζι.	Περονόσπορος ( <i>Peronospora spp.</i> , <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	600-1000	4	Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
	Σεπτορίωση ( <i>Septoria spp.</i> )			Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά.
	Ανθράκνωση ( <i>Colletotrichum spp.</i> )			Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σπορόφυτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Τομάτα	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> )	600-1000	8	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
	Βακτηριακή κηλίδωση ( <i>anthomonas campestris</i> )			Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της
Ρεβίθια	Ασκοχύτωση ( <i>Ascochyta rabiei</i> )	600-1000	4	Εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων τις ασθένειας
Πατάτα	περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> )	600-1000	8	Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας οι εφαρμογές ξεκινούν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Δασικά δέντρα	Περονόσπορος ( <i>Peronospora spp.</i> )	600-1000	6	Εφαρμογές που αρχίζουν με την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων.
Καλλωπιστικά	Σεπτορίωση ( <i>Septoria spp.</i> )			Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση.
	Φυτόφθορα ( <i>Phytophthora spp.</i> )			

### Χρόνος ασφάλειας

**Φυλλώδη Λαχανικά (λάχανο, μαρούλι, σπανάκι, σέλινο), Εσπεριδοειδή, Αμπέλι, Μηλιά, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Πατάτα, Ρεβίθια: 15 ημέρες**  
**Τομάτα και υπόλοιπα λαχανικά : 3 Ημέρες**

### Παρατηρήσεις:

- Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή, και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της

ασθένειας. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.

- Για τους χειμερινούς ψεκασμούς χρησιμοποιείται την υψηλή δοσολογία.

**Φυτοτοξικότητα:**..... Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηλιά μετά το φούσκωμα των οφθαλμών. Επίσης, μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα καθώς και με maneb, mancozeb, folpet, captan, thiram, και δινιτροορθοκρεζόλη. Επίσης, δεν συνδυάζεται με ελαιούχα σκευάσματα όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός εποχής του ληθάργου των δέντρων.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Ομάδα Τρόπου Δράσης: M1

**Σήμανση τοξικότητας:** Χη-Επικίνδυνο, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**Φράσεις κινδύνου:**

**R22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

**R51/53** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

**Φράσεις ασφάλειας**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε

**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

**S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

**SY11** Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης και άρδευσης με το προϊόν ή το σκεύασμα. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 3 εβδομάδες.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

### Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα, κρατήστε το σε ηρεμία και καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκαλέσετε εμετό.

**Αντίδοτο:** EDTA, BAL, Πενικιλλαμίνη

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.