

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Θερινός Πολτός Φάρμα-Χημ 98,5 EC  
με αριθμό εγγραφής 2841.

09 Ιουλίου 2010

Κάτοχος εγγραφής: Farma-Chem ABEE

Εμπορικό Όνομα: Θερινός Πολτός Φάρμα-Χημ 98,5 EC

Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: paraffinic oil (CAS RN 8042-47-5) 98,5% β/β  
βοηθητικές ουσίες 1,5% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: paraffinic oil (CAS RN 8042-47-5) 100%β/β

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Newdorff GmbH

Παρασκευαστής σκευάσματος: ΦΑΡΜΑ - ΧΗΜ ΑΒΕΕ, Ελλάδα

Διανομέας: L. Lambrou Agro Ltd

**Στόχος για τον οποίο προορίζεται:**

Θερινός πολτός κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (μέχρι απορροής) με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μπέκ τύπου σκούπας

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:**

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστήρα αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά.

Σε περίπτωση που το αναμειξουμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

## Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Εχθροί	Δόση (κ.εκ. / 100 λ νερό)	Χρόνος εφαρμογής
<b>Εσπεριδοειδή</b>  Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Κιτρομηλιά	-Κοκκοειδή (κόκκινη ψώρα, μυτιλόμορφη ψώρα, άσπρη ψώρα, ψευδόκοκκος, παρλατόρια, λεκάνιο) -Αφίδες -Ακάρεα -Προνύμφες εντόμων	1000-1300 ή 500 σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: -Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης) -Καλοκαιριού -Φθινοπώρου -Χειμώνα Η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και το χειμώνα (Φεβρουάριο-Μάρτιο)
<b>Μηλοειδή</b>  Μηλιά Αχλαδιά	-Κοκκοειδή (βαμβακάδα, μαύρη ψώρα, μυτιλόμορφη ψώρα, σφαιρολεκάνιο) -Αυγά ακάρεων -Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων		Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: -Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειμώνα.
<b>Πυρηνόκαρπα</b>  Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά	-Κοκκοειδή (βαμβακάδα, μαύρη ψώρα, μυτιλόμορφη ψώρα, σφαιρολεκάνιο) -Αυγά ακάρεων -Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων		
<b>Ελιά</b>	-Κοκκοειδή (παρλατόρια, ασπιδιωτός, λεκάνιο, πολίνια) -Προνύμφες εντόμων		
<b>Καλλωπιστικά</b>	-Κοκκοειδή (παρλατόρια, μυτιλόμορφη ψώρα) -Αυγά τετρανύχων -Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων		

### Παρατηρήσεις:

- Κατά τη χρήση του θερινού πολτού τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
- Να μην γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.

**Χρόνος ασφάλειας: 20 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες**

**Φυτοτοξικότητα:**

1. Να μη γίνεται εφαρμογή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C.
2. Να μην εφαρμόζεται επί 30 ημέρες πριν ή μετά από εφαρμογές σκευασμάτων που περιέχουν θείο ή θειασβέστιο.
3. Στα μηλοειδή και ιδιαίτερα στην ποικιλία κρυστάλλι, να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan για διάστημα τουλάχιστον μίας (1) εβδομάδας.
4. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ. σε μερικά καλλωπιστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με ισχυρώς αλκαλικά σκευάσματα (βορδιγάλειο πολτό, θειασβέστιο, θείο, propargite, captan). Να μην χρησιμοποιείται μαζί ή αμέσως πριν ή μετά από ψεκασμό με folpet.

**Σήμανση τοξικότητας:** -

**Φράσεις ασφάλειας**

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
- S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό
- S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα
- S37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
- S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο**

Σε περίπτωση εισπνοής μετακινήστε τον παθόντα από την περιοχή. Εάν δεν αναπνέει κάντε τεχνητή αναπνοή. Αν χρειαστεί ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Κατά την κατάποση μπορεί να προκληθεί αναρρόφηση προκαλώντας βλάβη στους πνεύμονες.....

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.....

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

### **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας**

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν ή σκισθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.....