



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3471, ημερομηνίας 03/05/2012 για χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικό προϊόν με τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ισπανία,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **PHILABUSTER 400SC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

2942

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

20/08/2012

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/03/2017

2. Κάτοχος της άδειας:

Janssen PMP  
Turnhoutseweg 30,  
2340 Beerse, Belgium

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Groexport Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Groexport Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	1 λίτρο	Sealed opaque with polyethylene bottle

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής των δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

## Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων για μετασυλλεκτική χρήση σε συσκευαστήρια εσπεριδοειδών και αχλαδιών για την αποφυγή των κύριων σήψεων που προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή και αχλάδια κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.  
Το imazalil είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση και το pyrimethanil έχει προληπτική δράση καθώς και δράση με τους ατμούς.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

### 3. Τρόπος Εφαρμογής:

#### Στα εσπεριδοειδή:

**1. Με διαβροχή των καρπών (σύστημα «drencher»):** Εφαρμογή απ' ευθείας πάνω στα φρούτα με διαβροχή των καρπών κατά την είσοδο στο συσκευαστήριο, πριν εισαχθούν στο θάλαμο συντήρησης.

**2. Ψεκασμός χαμηλού όγκου στη γραμμή συσκευασίας:** με αναλογία 500 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού κατά την είσοδο στο συσκευαστήριο, πριν εισαχθούν στο θάλαμο συντήρησης.

Πραγματοποιούνται το μέγιστο 2 εφαρμογές. Η πρώτη πριν τη συμπλήρωση 16 ωρών από τη συγκομιδή. Η δεύτερη γίνεται προαιρετικά, στη γραμμή συσκευασίας (με ψεκασμό χαμηλού όγκου) πριν την αποστολή των φρούτων.

#### Στα αχλάδια:

Εφαρμογή απ' ευθείας πάνω στα φρούτα με διαβροχή των καρπών (**σύστημα «drencher»**) κατά την είσοδο στο συσκευαστήριο, πριν εισαχθούν στο θάλαμο συντήρησης και πριν τη συμπλήρωση 16 ωρών από τη συγκομιδή, με μία εφαρμογή με δόση 200 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού.

### 4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο με επαρκή ποσότητα νερού και ξεκινούμε τη μηχανική ανάδευση. Προσθέτουμε σιγά σιγά την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς και μετά την προετοιμασία του διαλύματος. Το έτοιμο διάλυμα δεν θα πρέπει να παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## 5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών
<b>Καρποί εσπεριδοειδών</b> (πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπφρουτ, μανταρίνια- συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια -, λιμμέτιες (limes), φράπες	<u>Μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών από:</u> <i>Penicillium italicum</i> <i>Penicillium digitatum</i> <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> <i>Botrytis cinerea</i>	200-250 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό  500 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό	α) Διαβροχή των καρπών (Drench 25-30")  β) Ψεκάσμος χαμηλού όγκου στη γραμμή συσκευασίας	1-2
<b>Αχλάδια</b>	<u>Μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών από:</u> <i>Penicillium expansum</i> <i>Botrytis cinerea</i>	200 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό	Διαβροχή των καρπών (Drench 25-30")	1

Παρατηρήσεις: Χρησιμοποιείται σε ποικιλίες αχλαδιών με αυξημένη σκληρότητα (ελάχιστη σκληρότητα 6,5) όπως: Abate Fetel, Barlet Williams, Concorde, Conference, Doyenne du Cornice, Durondeau, Packhams, Blanquilla, Kaiser (Bosc), Angelys, Beurre Hardy, Triomphe de Vienne. Πριν από την εφαρμογή σε άλλη ποικιλία, πραγματοποιείστε πρώτα μια δοκιμή σε μικρή κλίμακα για να αποφύγετε πιθανές ασυμβατότητες.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εσπεριδοειδή, Αχλάδια	1 ημέρα

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: - imazalil: 3  
- pyrimethanil: 9**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

----

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

----

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

----

10. Συνδυαστικότητα:

----

11. Σήμανση φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Xn – Επιβλαβές, N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

## 12. Φράσεις κινδύνου:

<b>R22</b>	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
<b>R41</b>	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
<b>R43</b>	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
<b>R51/53</b>	Τοξικό για τούς υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

## 13. Φράσεις ασφάλειας:

<b>S1/2</b>	Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
<b>S13</b>	Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
<b>S20/21</b>	Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
<b>S23</b>	Μην αναπνέετε τους ατμούς και το ψεκαστικό υγρό
<b>S36/37/39</b>	Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

Οι εργάτες να χρησιμοποιούν κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση.

Οι εργάτες να χρησιμοποιούν κατάλληλα γάντια όταν χειρίζονται τα φρούτα στα οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.

**S46** Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα

**SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης από αυλές και δρόμους

**Spo2** Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

**S61** Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης”

## 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα από το χώρο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Απομακρύνετε τους φακούς επαφής και πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

**Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο

**ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.** Τα υγρά απόβλητα από την εφαρμογή ή τον καθαρισμό του εξοπλισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία με μια από τις εγκεκριμένες διαδικασίες απορρύπανσης (Μέθοδο FUNDS, κτλ.).

**Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:**

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: .....**20/08/2012**.....

.....  
(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα