



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ.15 ημερομηνίας 17/01/2013 για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και την επιστολή του αιτητή με ημ. 17/01/2013 για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **...BASAGRAN 48SL...** ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

508

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

25/11/2012

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2015

2. Κάτοχος της άδειας:

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε
Λεωφόρος Μεσογείων 449
15243 Αγία Παρασκευή
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Agrolan Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Agrolan Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Basagran 48SL

2. Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: bentazone: 48% β/ο (ως άλας νατρίου του bentazone 49.8% β/ο)
βοηθητικές ουσίες: 56,4% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. BASF Aktiengesellschaft, Γερμανία
2. Κ+N Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε., Ελλάδα

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|--|-------|
| 1. | Φιάλες | 50κ.εκ., 500κ.εκ., 1 λίτρο και 5 λίτρα | HDPE |

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: bentazone

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 960g/Kg

3. Παρασκευαστής των δ.ο.: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το BASAGRAN 48SL είναι εκλεκτικό μη διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων και κυπεροειδών στις καλλιέργειες φασόλια, μπιζέλια(αρακάς), ρύζι και στο γκαζόν.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

5. Φάσμα Δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Ζιζάνιο που ελέγχεται | Δόσεις | | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|----------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--|
| | | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) | κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη | | |
| Φασόλια Μπιζέλια (Αρακάς) | <u>A. Ευαίσθητα είδη</u> 1. Ζιζάνια της οικογένειας <i>Cyperaceae</i> Κίτρινη Κύπερη (<i>C. esculentus</i>) Μοσχοκύπερη (<i>Cyperus difformis</i>) και τον Σκίρπο (<i>Scirpus maritimus</i> , <i>S. mucronatus</i>) | 30 – 40 | 250 – 300 κ.εκ. σκευάσματος ανά δεκάριο ανάλογα με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μεγαλύτερη δόση αντιστοιχεί στα μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια ή σε μεγαλύτερο στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων | Ψεκάζουμε από το δεύτερο μέχρι και το πέμπτο πραγματικό φύλλο της καλλιέργειας | Μία εφαρμογή |
| Ρύζι | <u>Πλατύφυλλα:</u> Πεντάνευρο (<i>Allisma spp</i>), Άγριο Σινάπι (<i>Sinapis arvensis</i>), Βούτομο (<i>Butomus umbellatus</i>), Αγριομελιτζάνα (<i>Xanthium strumarium</i>), Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>), Σπεργούλα (<i>Spergula arvensis</i>) Ραπανίδα (<i>Rapahanus raphanistrum</i>), Αγριομπαμπακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>), Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>), Αναγαλλίς (<i>Anagallis arvensis</i>), Ζωχός (<i>Sonchus asper</i>), Ρανούκγουλος (<i>Ranunculus sardous</i>), Λινδέρνια (<i>Lidernia spp</i>) | | | Ψεκάζουμε από το δεύτερο φύλλο μέχρι και το τέλος του αδελφώματος του ρυζιού. Πριν την εφαρμογή χαμηλώνουμε την στάθμη του νερού στα τηγάνια, έτσι ώστε τα ζιζάνια να είναι εκτεθειμένα στο ψεκαστικό διάλυμα. Διατηρούμε την στάθμη χαμηλά για δύο μέρες μετά την εφαρμογή. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων | |
| Γκαζόν | <u>B. Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια</u> <u>Πλατύφυλλα:</u> Βλήτα (<i>Amaranthus spp</i>), Ιπόμαια (<i>Ipomoea spp</i>), Παπαρούνα (<i>Papaver rhoeas</i>), Δωδεκάνθι (<i>Lamium amplexicaule</i>) και Πολυκόμπι (<i>Polygonum convolvulus</i>). | | | α) Σε νέα φυτεία ψεκάζουμε από το δεύτερο μέχρι και το πέμπτο φύλλο της καλλιέργειας, β) σε εγκαταστημένη φυτεία, ψεκάζουμε σε οποιοδήποτε στάδιο της καλλιέργειας. | |

Παρατηρήσεις:

- Για να δράσει το ζιζανιοκτόνο δεν πρέπει να βρέξει ή να ποτίσουμε με τεχνητή βροχή για 5-6 ώρες μετά την εφαρμογή. Καλό είναι να έχει γίνει πότισμα 2-3 ημέρες πριν την εφαρμογή.
- Μην ψεκάσετε όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι ή ασθένειες και έντομα.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείται σε ήδη δοκιμασμένες ποικιλίες φασολιών, διαφορετικά να γίνεται πρώτα δοκιμή σε μικρή έκταση.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Καλλιέργειες | Χρόνος Ασφάλειας |
|----------------------------|------------------|
| Φασόλια, Μπιζέλια (Αρακάς) | 49 ημέρες |
| Ρύζι | 56 ημέρες |

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: - bentazone: C3

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

- Κάτω από ακραίες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθούν νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα των ψυχανθών χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείται σε ήδη δοκιμασμένες ποικιλίες φασολιών, διαφορετικά να γίνεται πρώτα δοκιμή σε μικρή έκταση

10. Συνδυαστικότητα:

11. Σήμανση φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Xn – Επιβλαβές, N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

12. Φράσεις κινδύνου:

- R22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- R51/53** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

13. Φράσεις ασφάλειας:

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
- S24** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
- S37** Φοράτε κατάλληλα γάντια
- S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
- S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης”

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατεύστε τον από υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Καλέστε γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: ...21/01/2013.....

.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα